

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

RHONE-ALPES

4, place Gensoul - LYON Téléphone : FRanklin 20-56

Bimensuel

Compte Chèques postaux Lyon 9430-12 — Régisseur Recettes Service Protection des Végétaux, 4, place Gensoul, Lyon (2°)

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région.

AVERTISSEMENTS

VIGNE

VERS DE LA GRAPPE. — Le vol de première génération se poursuit dans de nombreuses régions et les vers éclos vivent en tordeuses sur les pousses. D'autre part, les pluies orageuses successives du 11 au 16 ont, en grande partie, entraîné les produits déposés lors du précédent traitement. Ce dernier devra donc être renouvelé d'urgence sauf dans les régions 130, 131, 132, 145, 151 et 152, où les éclosions de larves étaient terminées avant les pluies.

MILDIOU. — (Région « Beaujolais », voir avis spéciaux affichés en mairie et servis aux abonnés de ce secteur).

Le premier traitement devra être appliqué ou renouvelé dès réception dans les cas suivants :

- 1° dernier traitement entre le 12 et le 15 mai dans les régions suivantes :
- AIN: 41 à 49.
- DROME: 128.
- ISERE: 103.
- LOIRE: 6-8-9-10-11.
- RHONE: 21-23-24-25-26-27-28-32-33-34.
- 2° pas de traitement depuis le 12 mai dans les régions suivantes :
- AIN: 50.
- ARDECHE: 151.
- DROME: 127.
- HAUTE- SAVOIE: 61-65-66-67-68.
- ISERE: 108-109-110-111-114.
- RHONE: 22.
- SAVOIE: 84-85-86-87 (seulement Montmélian, Arbin et Verrens-Arvey), 89 (seulement Chavanne, Planaise, Saint-Pierre-de-Soucy), 90.

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE. — Bien que les premières éclosions aient été constatées, les conditions elimatiques ont été généralement peu favorables à l'activité reproductrice de ce ravageur. Dans les seules régions suivantes, le premier traitement devra être appliqué entre le 24 et

le 27 mai :

- ARDECHE: 142 au sud de Beauchastel; 145-147 (vallée de l'Eyrieux seulement); 151-152 au-dessous de 300 mètres.
 - __ DROME: 130, 131, 132, 133.

P206

TORDEUSE ORIENTALE SUR PEPINIERES. — Appliquer un traitement sur pépinières de pêchers en toutes régions, entre le 23 et le 26 mai.

TAVELURES. — Des foyers importants et nombreux se sont développés en avril et au début de mai; des repiquages importants ont pu avoir lieu du 11 au 15 mai, et les pluies du 12 et du 15 ont entraîné les produits du dernier traitement en de nombreuses régions.

Un nouveau traitement devra être appliqué dans les conditions suivantes :

A. - D'urgence :

- 1º Dans toutes les plantations qui n'ont pas reçu de traitement depuis le 8 mai;
- 2° Dans toutes les plantations n'ayant pas reçu de traitement depuis le 12 mai dans les régions suivantes :

Toutes les régions indiquées au paragraphe 2° de la rubrique « Mildiou de la vigne », ainsi que dans le Rhône, les communes de Lantigné, Durette, Villié-Morgon, Corcelles et Lancié.

3° Dans toutes les plantations traitées entre le 12 et le 15 mai dans les régions suivantes : Toutes les régions indiquées au paragraphe 1° de la rubrique « Mildiou de la vigne ».

B. - Avant le 27 mai :

Dans toutes les plantations des régions survantes non traitées depuis le 15 mai :

- ARDECHE: 142, de Cornas à Beauchastel.
- DROME: 126-134-135.
- HAUTE-SAVOIE: 62-63-64-72.
- ISERE: 106-112-115-116.
- LOIRE : 2.
- SAVOIE : 88.

C. -- Avant le 30 mai :

Dans toutes les plantations des régions suivantes non traitées depuis le 15 mai :

- AIN: 51-52-119.
- ARDECHE: 141-146-150.
- DROME: 121-122-123-127.
- -- HAUTE-SAVOIE : 67. " -- HAUTE-SAVOIE : 67.
- ISERE: 101-102-104-105-117-118-119-120.
- **LOIRE**: 1-3-5-7-12-13.
- RHONE: 22-29-30.
- SAVOIE: 82-83-84-86.
- D. Attendre un avis ultérieur pour traiter toutes les plantations déjà traitées depuis le 15 mai.
- E. 25 jours après le traitement précédent : plantations non visées dans les paragraphes A et D.

POMMES DE TERRE

MILDIOU. — Un premier traitement devra être appliqué d'urgence dans les limites d'altitude suivantes :

Drôme et Ardèche, au sud de la Drôme et de l'Eyrieux : au-dessous de 500 mètres.
Drôme et Ardèche au nord de la Drôme et de l'Eyrieux, Isère, Savoie, Ain (vallée du

Rhône et bassin de Belley seulement), environs de Lyon et vallée du Gier : au-dessous de 400 m.

Vallée de la Saône, Bresse et Dombes.

BETTERAVE INDUSTRIELLE (Drôme et Isère)

TEIGNE. — Le premier traitement devra être effectué ou renouvelé des après le démariage. Il sera également efficace contre les altises qui deviennent très abondantes.

INFORMATIONS

VIGNE.

Nous rappelons que les taches primaires du mildiou sont d'abord « huileuses », jaunâtres, translucides, et que le duvet qui s'y forme reste blanc et léger. Elles ont rarement moins de 8 millimètres de diamètre et sont à peu près circulaires.

- Les taches d'érinose sont opaques, plus ou moins cloquées, sans coloration spéciale de la feuille ou rouges (suivant les cépages). Leur forme et leur dimension sont assez variables et elles ont fréquemment moins de 5 millimètres. Le duvet qui s'y forme est rapidement épais et devient brun ou rose vineux (suivant les cépages).

BLACK-ROT. — Cette maladie est en recrudescence dans plusieurs circonscriptions voisines. Elle se manifeste en cours de saison, sur feuilles, par des taches desséchées brun clair, bien délimitées, de 3 à 8 millimètres de diamètre en général, grossièrement circulaires, en des points quelconques du limbe; sur grappes, on assiste à un dessèchement progressif du grain, qui se couvre de petites pustules brun sombre.

Les viticulteurs qui constateraient de tels symptômes au cours de la saison, voudeont bien nous envoyer des échantillons et quelques renseignements, notamment date d'apparition, cépages atteints, importance de l'attaque, situation des foyers, derniers traitements effectués.

ARAIGNEES ROUGES. — Du fait des grandes variations de température enregistrées depuis un mois et demi, et de la sécheresse, le développement de l'araignée rouge a été irrégulier et lent et la croissance de la vigne faible. De ce fait, cette dernière n'a pas encore pris le dessus sur le ravageur, et il importe de profiter de la première poussée de sève qui se présentera (l'époque actuelle paraît déjà favorable) pour appliquer un nouveau traitement. On utilisera de préférence un acaricide-ovicide au chlorobenzilate ou l'aramite (divers autres ovicides d'été sont également en autorisation provisoire de vente).

OIDIUM. - Les conditions climatiques étant à nouveau favorables à cette maladie, il y aura lieu d'ajouter du soufre au prochain traitement prévu, sur les cépages sensibles.

ARBRES FRUITIERS

COCHENILLES. — Pou de San-José et cochenille du mûrier.

— Dans la région lyonnaise, les premières éclosions ont été constatées autour du 11 mai dans les situations les plus favorables. La prochaine vague de chaleur va les accélérer, et le premier traitement sera conseillé par un bulletin ultérieur, dès que la proportion des celosions sera suffisante pour le justifier.

Toutefois, le traitement contre la cochenille du mûrier devra être appliqué dès la première journée chaude, dans les régions les plus méridionales, à savoir se production des

- ___ Drôme : en plaine, au sud de la ligne Tain, Romans, Saint-Nazaire-en-Royans.
- Ardèche : dans les vallées au-dessous de 200 mètres d'altitude.

ARAIGNEES ROUGES. — Des éclosions massives sur pêcher, poirier et pommier sont

constatées depuis une dizaine de jours dans toute la région.

Au cas où les produits conseillés contre les autres ravageurs à traiter dans les diverses régions ne seraient pas efficaces contre ces araignées rouges, ces dernières devront faire, dans les prochains jours, l'objet d'un traitement spécial.

PRODUITS A UTILISER

a) VERS DE LA GRAPPE :

- en poudrage : D. D. T., Roténone ou Parathion;

- en pulvérisation : Arséniate de plomb, D. D. T., Parathion; et en autorisation provisoire de vente : Diazinon, Malathion, mélanges D. D. T. + Lindane.

Dans les foyers d'araignées rouges, bien qu'on ne sache pas encore avec précision l'effet de ces produits sur tous les parasites de l'araignée rouge, éviter l'emploi du D. D. T. et du

D'autre part, éviter le mélange parathion + bouillie bordelaise.

b) MILDIOU DE LA VIGNE :

- .- bouillie bordelaise;
- bouillie bourguignonne;
- sulfate basique de cuivre;
- oxychlorure de cuivre;
- oxydes cuivreux;
- acétate neutre de cuivre (Verdet),

et en autorisation provisoire de vente :

- -- captane;
- zinèbe;
- combinés zinèbe + cuivre.

c)	CARPOCAPSE:	
	arséniate de plomb + mouillant;	il) mus branchershifts their some
	- produit titrant au moins 20 % de D. D. T.;	
	— parathion;	
	et en autorisation provisoire de vente :	
133	— diazinon, malathion, lindane émulsion, métho	oxychlor;
d)	TORDEUSE ORIENTALE EN PEPINIERES :	
u,	— parathion;	
100	S. P. C.	ali na culturare diffratalizarem
۵١	어린 사이트 보고 있다면 하다 하는데 하는데 하는데 다른데 다른데 다른데 다른데 다른데 다른데 다른데 다른데 다른데 다른	TO THE MEDICAL AND THE PARTY OF
e)	200일 대회 (제상, 제상, 제상, 제상, 제상, 제상, 제상, 제상, 제상, 제상,	
	bouillie bordelaise; bouillie sulfocalcique;	to the sent of Section Societies
	- oxychlorure de cuivre;	
	— sulfate basique de cuivre;	engle contorred bein ally eyes (if he ad
		the demonstration of the autopies
	soufre micronisé; captane;	energia en la constitución
	zinèbe;	paragonal su retelevati nell car
	et en autorisation provisoire de vente :	
	— zirame, thirame, oxyquinoléate de cuivre, d nodinitrobenzène.	lichloronaphtoquinone, thiocya-
de	Tous les produits contenant du cuivre présentent des risque ou frais et calme.	ies de brûlures par temps hu m i-
f)	MILDIOU DE LA POMME DE TERRE :	tractical and a language three projects and an extraction of the second state of the s
	Bourne Solution,	en translated of Minimized
	— sulfate basique de cuivre;	
	day antigmanary	
	et en autorisation provisoire de vente :	
	— captane, zinèbe, méianges cuivre + zinèbe c	et cuivre + zirame.
		no managana anta situana kanagana kanagana kaong kalabana kanafirati kanagana
g)	TEIGNE ET ALTISES DE LA BETTERAVE :	consolity beginned for the engine
	- D. D. T., H. C. H., Lindane, Chlordane;	the analysis of some of action to write by
	— parathion.	
	Tous ces produits seront appliqués de préférence par pou	drage.
h)	COCHENILLE DU MURIER :	
11)	— parathion et oléoparathion	The state of the s
		and an analysis of the control of th
i)	ARAIGNEES ROUGES SUR ARBRES FRUITIERS :	
	— parathion;	man and rest of the adjust his waste
	— diazinon;	Branch with due and
	— E. P. N.; — déméton méthylé;	
	et en autorisation provisoire de vente :	THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF
	et en autorisation provisoire de vente : — endothion;	
	— malathion;	
	— aramite.	A Secretaria de la Companya del Companya del Companya de la Compan
	Le Contrôleur	L'Inspecteur
cl	chargé des Avertissements agricoles :	de la Protection des végétaux:
		The second of the second

P. LATARD.

A, PITHIOUD.